

Onze groene wijk is prachtig gelegen, direct grenzend aan de Bijlmerweide met daar achter het Diemberbos. Ik heb al eens over de sperwer geschreven die in onze wijk jaagt en over de ransuil en de bosuil. Alle drie broeden ze in ons park de Bijlmerweide of gewoon in onze wijk.

Iedere zomer hoor ik weer het luide geroep van de buizerds boven Geerdinkhof. Vooral als de jongen uitvliegen krijgen ze uitgebreid vlieglessen van hun ouders. Hun contactroep wordt het duidelijkst omschreven als miauwen. Maar dat geluid maken ze niet alleen als ze met de jongen rondvliegen, ook al vroeg in het voorjaar kun je dat geluid horen als beide partners om elkaar heen cirkelen boven het park en Geerdinkhof.

Ze broeden al jaren in de bomen rondom het voetbalveldje, recht achter onze wijk. Er zijn daar in de bomen verschillende grote nesten te zien en dat kan wel kloppen, want buizerds onderhouden regelmatig meerdere nesten. Meestal is het geen nieuwbouw, maar gebruiken ze bestaande nesten van bijvoorbeeld kraaien die ze verder uitbouwen en ieder voorjaar restaureren en opknappen. Ook verlaten nesten van bijvoorbeeld haviken kunnen ze in gebruik nemen. Buizerds zijn te herkennen aan de afgeronde vleugels met duidelijke vingers. Ze zijn onderling wel zeer verschillend van kleur, ze hebben vaak allerlei bruinige en zwarte vlekken, maar ook lichtere delen. Regelmatig zie je bijna witte, maar ook zeer donkere exemplaren. Zoals alle roofvogels die zich in de lucht vertonen, worden ze vaak lastiggevallend door kraaien. Ook boven onze wijk zijn regelmatig deze pesterijen te zien.

Buizerds zijn een bekende verschijning langs provinciale wegen en snelwegen. Ze zitten bijna altijd op de lage takken van een boom, of op een hekje of paaltje. Ze houden de omgeving scherp in de gaten en reageren bliksemsnel als een prooidier zich laat zien. Dat kan van alles zijn: natuurlijk muizen of jonge vogeltjes en bij uitzondering ook wel jonge konijntjes. Ze zijn zeker niet eenkennig. Ook kikkers, salamanders, regenwormen of kevers zullen ze pakken en ze zijn zeker niet afkerig van aas. Aangereken dieren langs de weg vormen natuurlijk een makkelijke feestmaaltijd.

In de winterperiode komen er ook veel buizerds uit Scandinavië en Rusland op bezoek omdat de winters hier aanzienlijk milder zijn. Dan is het nog veel drukker met foeragerende buizerds langs de snelwegen.

De Bijlmerweide en het Diemberbos vormen een prima broedgebied voor deze roofvogels. Veel dichte boomgroepjes en bomenrijen direct langs open velden, slootjes en wegen. Prima

habitat om te broeden en voedsel te vinden. Net als de meeste andere roofvogels in Nederland gaat het gelukkig weer veel beter met de buizerd. In de jaren zestig waren alle roofvogels bijna uitgestorven omdat er driftig met DDT werd gespoten tegen allerlei insecten. Die creperende insecten werden gegeten door allerlei vogels en andere dieren die vervolgens ook weer crepeerden en weer gegeten werden door roofvogels. Er waren in die tijd nog maar enkele tientallen broedparen buizerds en haviken in Nederland.

De buizerd is nu zelfs 'algemeen' geworden met naar schatting zo'n 12.000-20.000 broedparen in ons land. Op de hogere delen van ons land en de zandgronden komt hij talrijker voor dan in laagland of polders in het westelijke deel.

Uiteraard is zijn verspreidingsgebied veel groter: van Scandinavië tot de Middellandse Zee en oostelijk tot ver in Rusland.

Al vroeg in het voorjaar, in februari en maart, vooral op zonnige dagen beginnen de dieren 'miauwend' contact te zoeken al cirkelend boven velden en langs bosranden.

Als een paartje is gevormd gaan ze meestal over tot het opknappen en uitbouwen van een oud nest. Daarvoor dragen ze dagen achtereen nieuwe takken aan.

In april zullen er twee tot vier eieren worden gelegd. Dan start de broedperiode die ruim een maand duurt. In die tijd brengt het mannetje de prooien naar het broedende vrouwtje op het nest. Ook als er kuikens zijn zorgt het mannetje steeds voor de aanvoer van prooien. Het vrouwtje voert dan de jongen op het nest en dat gaat best lang duren, zo'n twee maanden.

Dus middenin de zomer, rond juli, zullen de ouders starten met de vlieglessen. Ook dan is de klagende roep van de vogels regelmatig te horen. De jongen worden na het uitvliegen nog eens zes tot acht weken gevoerd. Dus pas tegen het najaar gaat het gezin uit elkaar. Uiteraard is er maar één broedsel per jaar en gemiddeld vliegen er in ons land twee jongen per nest uit en zo kan de populatie gestaag groeien.

Bijgaande foto maakte ik enkele jaren terug in de buurt van Ouderkerk.

Ik wens iedereen een rustige winter,
Ruud Wolterman

